

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ

ГЛОБАЛЬНАЯ СТАТИСТИКА 2014

15 миллионов человек имели доступ к антиретровирусной терапии (март 2015 г.)

36,9 [34,3–41,4] миллиона человек во всем мире жили с ВИЧ

2 [1,9–2,2] миллиона человек заразились ВИЧ за год

1,2 [1–1,5] миллиона человек умерли от болезней, связанных со СПИДом

Люди, живущие с ВИЧ, имеют доступ к антиретровирусной терапии

- По состоянию на март 2015 года 15 миллионов человек, живущих с ВИЧ, имели доступ к антиретровирусной терапии – в июне 2014 это число составляло 13,6 миллиона.
- 41% [38%-46%] всех взрослых, живущих с ВИЧ, имели доступ к лечению в 2014 году – в 2010 году этот показатель составлял 23% [21%-24%].
- 32% [30%-34%] всех детей, живущих с ВИЧ, имели доступ к лечению в 2014 году – в 2010 году этот показатель составлял 14% [13%-15%].
- 73% [68%-79%] беременных женщин, живущих с ВИЧ, имели доступ к антиретровирусным препаратам для профилактики передачи ВИЧ младенцам в 2014 году; с 2000 по 2014 годы число новых ВИЧ-инфекций среди детей снизилось на 58%.

Люди, живущие с ВИЧ

- В 2014 году число людей, живущих с ВИЧ, составляло 36,9 [34,3–41,4] миллиона.
- С 2000 года примерно 38,9 миллиона человек заразились ВИЧ и 25,3 миллиона человек умерли от болезней, связанных со СПИДом.

Новые ВИЧ-инфекции

- С 2000 года число новых ВИЧ-инфекций снизилось на 35%.
- Во всем мире число людей, заразившихся ВИЧ в 2014 году, составило 2 [1,9–2,2] миллиона человек – в 2000 году это число составляло 3,1 [3,0–3,3] миллиона.
- С 2000 года число новых ВИЧ-инфекций среди детей снизилось на 58%.

- Во всем мире число детей, заразившихся ВИЧ в 2014 году, составило 220 000 [190 000–260 000] – в 2000 году это число составляло 520 000 [470 000–580 000].

Число смертей, связанных со СПИДом

- Если сравнивать с пиковым показателем в 2004 году, число смертей, связанных со СПИДом, уменьшилось на 42%.
- В 2014 году число людей, умерших от болезней, связанных со СПИДом, во всем мире составило 1,2 [1–1,5] миллиона человек – для сравнения в 2005 году это число составляло 2 [1,8–2,6] миллиона.

ВИЧ/туберкулез

- С 2004 года число смертей в связи с туберкулезом среди людей, живущих с ВИЧ, снизилось на 33%.
- Туберкулез остается ведущей причиной смертности среди людей, живущих с ВИЧ, – на него приходится примерно пятая часть смертей, связанных со СПИДом.
- В 2013 году процент больных туберкулезом с диагнозом ВИЧ, которые начали или продолжали антиретровирусное лечение, достиг 70% (в 2012 году этот показатель составлял 60%).

Инвестиции

- Мир, по-видимому, достигнет целевого показателя по инвестициям, установленного в Политической декларации по ВИЧ/СПИДу 2011 года, который предусматривал выделение от 22 до 24 млрд. долларов США на меры противодействия СПИДу в странах с низким и средним уровнем доходов к 2015 году.
- По состоянию на конец 2014 года объем средств, выделенных на осуществление мер противодействия СПИДу в странах с низким и средним уровнем доходов, составил 20,2 млрд. долларов США.
- Внутренние средства составили 57% от общего объема средств, выделенных на противодействие СПИДу в странах с низким и средним уровнем доходов в 2014 году.
- С 2009 по 2014 годы 84 из 121 страны с низким и средним уровнем доходов увеличили внутренние расходы на противодействие СПИДу. Среди них 46 стран указали на то, что они увеличили объем таких средств более чем на 50%, в том числе 35 стран указали на то, что они увеличили объем внутренних расходов более чем на 100%.
- 44 страны с низким и средним уровнем доходов получили 75 или более процентов средств на противодействие СПИДу от международных доноров.
- По оценкам ЮНЭЙДС, в 2020 году на противодействие СПИДу потребуется 31,9 млрд. долларов США, а в 2030 году – 29,3 млрд. долларов США.

РЕГИОНАЛЬНАЯ СТАТИСТИКА

Африка к югу от Сахары

- В 2014 году число людей, живущих с ВИЧ в Африке к югу от Сахары, составило **25,8 [24,0–28,7] миллиона**.
 - Более половины от общего числа людей, живущих с ВИЧ в Африке к югу от Сахары, составили женщины.
- В 2014 году оценочное число новых ВИЧ-инфекций в Африке к югу от Сахары составило **1,4 [1,2–1,5] миллиона**.
 - С 2000 по 2014 годы число новых ВИЧ-инфекций снизилось на **39%**.
 - На Африку к югу от Сахары приходится **70%** от общего числа новых ВИЧ-инфекций во всем мире.
- В 2014 году в Африке к югу от Сахары число людей, умерших от болезней, связанных со СПИДом, составило **790 000 [690 000–1,0 миллиона]**.
 - С 2005 по 2014 годы число смертей в связи со СПИДом в Африке к югу от Сахары снизилось на **48%**.
- В Африке к югу от Сахары доступ к антиретровирусному лечению имели 10,7 миллиона человек, или **41%** всех людей, живущих с ВИЧ в этом регионе, – в 2002 году это число составляло менее 100 000 человек.
 - В 2014 году в Африке к югу от Сахары доступ к антиретровирусной терапии имели **36% [34%–39%]** мужчин и **47% [40%–51%]** женщин.
 - **Пять из семи человек**, получающих антиретровирусную терапию, проживают в Африке к югу от Сахары.
- В 2014 году в Африке к югу от Сахары число новых ВИЧ-инфекций среди детей составило **190 000 [170 000–230 000]**.
 - С 2009 года число новых ВИЧ-инфекций среди детей в **21 приоритетной стране** Африки, указанной в Глобальном плане устранения новых случаев заражения ВИЧ среди детей и оказания помощи матерям, чтобы они могли оставаться в живых, снизилось на **48%**.

Азиатско-Тихоокеанский регион

- В 2014 году число людей, живущих с ВИЧ в Азиатско-Тихоокеанском регионе, составило **5 [4,5–5,6] миллионов**.
- В 2014 году оценочное число новых ВИЧ-инфекций в регионе составило **340 000 [240 000–480 000]**.
 - С 2000 по 2014 годы число новых ВИЧ-инфекций снизилось на **32%**.
 - На **Китай, Индонезию и Индию** приходится **78%** от всех новых ВИЧ-инфекций в регионе.
 - В 2014 году в Азиатско-Тихоокеанском регионе число людей, умерших от болезней, связанных со СПИДом, составило **240 000 [180 000–390 000]**.

- С 2000 по 2014 годы число смертей в связи со СПИДом в регионе увеличилось на **11%**.
- Охват лечением составляет **36% [32%–41%]** всех людей, живущих с ВИЧ в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
- По оценкам, в 2014 году в Азиатско-Тихоокеанском регионе **3,1 миллиона** взрослых **не имели доступа** к антиретровирусному лечению.
 - **Лишь в двух странах** Азиатско-Тихоокеанского региона, **Таиланде и Камбодже**, более **50% всех людей, живущих с ВИЧ**, в настоящее время **получают антиретровирусное лечение**.
- В 2014 году оценочное число новых ВИЧ-инфекций среди детей в Азиатско-Тихоокеанском регионе составило **21 000 [16 000–27 000]**.
 - С 2000 года число новых ВИЧ-инфекций среди детей в регионе снизилось на **27%**.

Латинская Америка

- В 2014 году число людей, живущих с ВИЧ в Латинской Америке, составило **1,7 [1,4–2] миллиона**.
- В 2014 году оценочное число новых ВИЧ-инфекций в регионе составило **87 000 [70 000–100 000]**.
 - С 2000 по 2014 годы число новых ВИЧ-инфекций снизилось на **13%**.
- В 2014 году число смертей в связи со СПИДом в Латинской Америке составило **41 000 [31 000–71 000]**.
 - С 2005 по 2014 годы число смертей в связи со СПИДом в регионе снизилось на **29%**.
- Охват лечением составляет **47% [40%–56%]** всех взрослых от 15 лет и старше, живущих с ВИЧ в Латинской Америке, и **54% [45%–63%]** среди детей от 0 до 14 лет.
- В 2014 году число новых ВИЧ-инфекций среди детей в Латинской Америке составило **2000 [1300–2900]**.

Западная и Центральная Европа и Северная Америка

- В 2014 году число людей, живущих с ВИЧ в Западной и Центральной Европе и Северной Америке, составило **2,4 [1,5–3,5] миллиона**.
- В 2014 году оценочное число новых ВИЧ-инфекций в регионе составило **85 000 [48 000–130 000]**.
 - На Соединенные Штаты приходится более половины всех новых ВИЧ-инфекций в регионе.
- В 2014 году число смертей в связи со СПИДом в Западной и Центральной Европе и Северной Америке составило **26 000 [13 000–47 000]**.
 - С 2005 по 2014 годы число смертей в связи со СПИДом в регионе оставалось постоянным.

- В 2014 году число новых ВИЧ-инфекций среди детей в Западной и Центральной Европе и Северной Америке составило **<500 [**<200–<500**]**.

Восточная Европа и Центральная Азия

- В 2014 году число людей, живущих с ВИЧ в Восточной Европе и Центральной Азии, составило **1,5 [1,3–1,8] миллиона**.
- В 2014 году оценочное число новых ВИЧ-инфекций в регионе составило **140 000 [110 000–160 000]**.
 - С 2000 по 2014 годы число новых ВИЧ-инфекций увеличилось на **40%**.
- В 2014 году число смертей в связи со СПИДом в Восточной Европе и Центральной Азии составило **62 000 [46 000–140 000]**.
- С 2000 по 2014 годы число смертей в связи со СПИДом в регионе увеличилось **более чем в три раза**.
- Охват лечением составляет **18% [16%–21%]** всех взрослых от 15 лет и старше, живущих с ВИЧ в Восточной Европе и Центральной Азии.
- В 2014 году число новых ВИЧ-инфекций среди детей в Восточной Европе и Центральной Азии составило **1200 [<1000–1600]**.

Карибский бассейн

- В 2014 году число людей, живущих с ВИЧ в Карибском бассейне, составило **280 000 [210 000–340 000]**.
- В 2014 году оценочное число новых ВИЧ-инфекций в регионе составило **13 000 [9600–17 000]**.
 - С 2000 по 2014 годы число новых ВИЧ-инфекций снизилось на **52%**.
- В 2014 году число смертей в связи со СПИДом в Карибском бассейне составило **8 800 [6000–17 000]**.
 - С 2000 по 2014 годы число смертей в связи со СПИДом в регионе снизилось **более чем наполовину**.
 - В 2014 году примерно половина всех смертей в связи со СПИДом в регионе приходилось на **Гаити**.
- Охват лечением составляет **44% [33%–54%]** всех взрослых от 15 лет и старше, живущих с ВИЧ в Карибском бассейне, и **36% [32%–42%]** среди детей.
- В 2014 году число новых ВИЧ-инфекций среди детей в Карибском бассейне составило **<500 [<500–<1000]**.

Ближний Восток и Северная Африка

- В 2014 году число людей, живущих с ВИЧ на Ближнем Востоке и в Северной Африке, составило **240 000 [150 000–320 000]**.
- В 2014 году оценочное число новых ВИЧ-инфекций в регионе составило **22 000 [13 000–33 000]**.

- С 2000 по 2014 годы число новых ВИЧ-инфекций выросло на **22%**.
- В 2014 году число смертей в связи со СПИДом на Ближнем Востоке и в Северной Африке составило **12 000 [8000–22 000]**.
- С 2000 по 2014 годы число смертей в связи со СПИДом в регионе увеличилось **более чем в три раза**.
- Охват лечением составляет **14% [9%–19%]** всех взрослых от 15 лет и старше, живущих с ВИЧ на Ближнем Востоке и в Северной Африке, и **15% [11%–18%]** среди детей в возрасте 0–14 лет.
- В 2014 году число новых ВИЧ-инфекций среди детей на Ближнем Востоке и в Северной Африке составило **2400 [1800–3300]**.

Глобальные тенденции развития ВИЧ в 2014 году

	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Люди, живущие с ВИЧ	28,6 [26,4-31,2] млн.	29,7 [27,5-32,2] млн.	30,5 [28,3-33,0] млн.	31,2 [28,9-33,7] млн.	31,6 [29,4-34,1] млн.	32,0 [29,9-34,5] млн.	32,4 [30,2-34,9] млн.	32,9 [30,6-35,4] млн.	33,3 [31,1-35,8] млн.	33,8 [31,6-36,4] млн.	34,4 [32,1-36,9] млн.	34,9 [32,6-38,1] млн.	35,6 [33,2-39,0] млн.	36,2 [33,8-40,8] млн.	36,9 [34,3-41,4] млн.
Новые ВИЧ-инфекции (всего)	3,1 [3,0-3,3] млн.	3,0 [2,9-3,2] млн.	2,9 [2,8-3,1] млн.	2,8 [2,7-3,0] млн.	2,7 [2,6-2,9] млн.	2,7 [2,5-2,8] млн.	2,6 [2,4-2,7] млн.	2,5 [2,4-2,7] млн.	2,4 [2,3-2,6] млн.	2,4 [2,2-2,5] млн.	2,3 [2,2-2,5] млн.	2,3 [2,1-2,4] млн.	2,2 [2,0-2,4] млн.	2,1 [1,9-2,3] млн.	2,0 [1,9-2,2] млн.
Новые ВИЧ-инфекции (среди взрослых)	2,6 [2,5-2,7] млн.	2,5 [2,4-2,6] млн.	2,4 [2,3-2,5] млн.	2,3 [2,2-2,4] млн.	2,2 [2,1-2,3] млн.	2,2 [2,0-2,3] млн.	2,1 [2,0-2,2] млн.	2,1 [1,9-2,2] млн.	2,0 [1,9-2,1] млн.	2,0 [1,9-2,1] млн.	2,0 [1,8-2,1] млн.	1,9 [1,8-2,1] млн.	1,9 [1,8-2,1] млн.	1,8 [1,7-2,0] млн.	1,8 [1,7-2,0] млн.
Новые ВИЧ-инфекции (среди детей)	520 000 [470 000–580 000]	530 000 [480 000–590 000]	530 000 [480 000–590 000]	530 000 [470 000–580 000]	520 000 [460 000–570 000]	500 000 [450 000–550 000]	490 000 [440 000–540 000]	470 000 [430 000–520 000]	450 000 [410 000–500 000]	400 000 [360 000–440 000]	360 000 [320 000–400 000]	330 000 [290 000–370 000]	280 000 [240 000–320 000]	250 000 [220 000–290 000]	220 000 [190 000–260 000]
Смерти в связи со СПИДом	1,6 [1,3-2,0] млн.	1,7 [1,5-2,2] млн.	1,8 [1,6-2,4] млн.	2,0 [1,7-2,5] млн.	2,0 [1,8-2,6] млн.	2,0 [1,8-2,6] млн.	2,0 [1,7-2,5] млн.	1,9 [1,6,-2,4] млн.	1,7 [1,5-2,2] млн.	1,7 [1,4-2,1] млн.	1,6 [1,4-2,0] млн.	1,5 [1,3-1,9] млн.	1,4 [1,2-1,8] млн.	1,3 [1,1-1,6] млн.	1,2 [1,0-1,5] млн.
Лица, имеющие доступ к лечению										6,1 млн.	7,5 млн.	9,4 млн.	11,4 млн.	13,0 млн.	14,9/*15,0 млн.(март)
Ресурсы	4,8 млрд. долл. США	4,9 млрд. долл. США	5,1 млрд. долл. США	6,3 млрд. долл. США	7,3 млрд. долл. США	9,4 млрд. долл. США	10,3 млрд. долл. США	12,1 млрд. долл. США	15,7 млрд. долл. США	15,6 млрд. долл. США	15,9 млрд. долл. США	18,2 млрд. долл. США	19,6 млрд. долл. США	20,4 млрд. долл. США	20,2 / 21,7 млрд. долл. США

Региональные данные о ВИЧ за 2014 год

Регион	Люди, живущие с ВИЧ, 2014 год		Новые ВИЧ-инфекции, 2014 год			Смерти в связи со СПИДом, 2014 год (всего)
	всего	дети	всего	взрослые	дети	
Африка к югу от Сахары	25,8 [24,0–28,7] млн.	2,3 [2,2 –2,5] млн.	1,4 [1,2–1,5] млн.	1,2 [1,1–1,3] млн.	190 000 [170 000–230 000]	790 000 [690 000–1,0 млн.]
Азиатско-Тихоокеанский регион	5,0 [4,5 -5,6] млн.	200 000 [180 000–230 000]	340 000 [240 000–480 000]	320 000 [230 000–450 000]	21 000 [16 000–27 000]	240 000 [180 000–390 000]
Латинская Америка	1,7 [1,4 -2,0] млн.	33 000 [29 000–40 000]	87 000 [70 000–100 000]	85 000 [68 000–100 000]	2000 [1300–2900]	41 000 [31 000–71 000]
Карибский бассейн	280 000 [210 000–340 000]	13 000 [11 000–15 000]	13 000 [9600–17 000]	13 000 [9300–16 000]	<500 [<500–<1000]	8800 [6000–17 000]
Ближний Восток и Северная Африка	240 000 [150 000–320 000]	13 000 [10 000–16 000]	22 000 [13 000–33 000]	20 000 [12 000–30 000]	2400 [1800–3300]	12 000 [8000–22 000]
Восточная Европа и Центральная Азия	1,5 [1,3 -1,8] млн.	17 000 [14 000–19 000]	140 000 [110 000–160 000]	130 000 [110 000–160 000]	1200 [<1000–1600]	62 000 [46 000–140 000]
Западная и Центральная Европа и Северная Америка	2,4 [1,5 -3,5] млн.	3300 [2200–4700]	85 000 [48 000–130 000]	85 000 [47 000–130 000]	<500 [<200–<500]	26 000 [13 000–47 000]
ВСЕГО В МИРЕ	36,9 [34,3 -41,4] миллиона	2,6 [2,4 -2,8] миллиона	2,0 [1,9 -2,2] миллиона	1,8 [1,7 -2,0] миллиона	220 000 [190 000–260 000]	1,2 [1,0 -1,5] миллиона

Региональная антиретровирусная терапия в 2014 году

	Оценочный процент беременных женщин, живущих с ВИЧ, которые получали антиретровирусные препараты для профилактики передачи от матери ребенку, 2014 г.	Оценочный процент взрослых (15+ лет), живущих с ВИЧ, которые получали антиретровирусную терапию, 2014 г.	Оценочный процент детей (0-14 лет), живущих с ВИЧ, которые получали антиретровирусную терапию, 2014 г.
Африка к югу от Сахары	75 [70 – 81]	43 [39 – 47]	30 [28 – 32]
Азиатско-Тихоокеанский регион	38 [33 – 45]	36 [32 – 41]	36 [33 – 40]
Латинская Америка	79 [65 – >95]	47 [40 – 56]	54 [46 – 64]
Карибский бассейн	89 [78 – >95]	44 [33 – 54]	36 [32 – 42]
Ближний Восток и Северная Африка	13 [10 – 17]	14 [9 – 19]	15 [11 – 18]
Восточная Европа и Центральная Азия	... [... – ...]	18 [16 – 21]	... [... – ...]
Западная и Центральная Европа и Северная Америка	... [... – ...]	... [... – ...]	... [... – ...]
ВСЕГО В МИРЕ	73 [68 – 79]	41 [38 – 46]	32 [30 – 34]

Контакты

Communications and Global Advocacy | +41 22 791 1697 | communications@unaids.org

ЮНЭЙДС

Объединенная программа Организации Объединенных Наций по ВИЧ/СПИДу (ЮНЭЙДС) возглавляет и вдохновляет мир для достижения единого видения: ноль новых ВИЧ-инфекций, ноль дискриминации и ноль смертей вследствие СПИДа. ЮНЭЙДС объединяет усилия 11 учреждений ООН – УВКБ ООН, ЮНИСЕФ, ВПП, ПРООН, ЮНФПА, ЮНОДК, «ООН-женщины», МОТ, ЮНЕСКО, ВОЗ и Всемирный банк – и тесно сотрудничает с глобальными и национальными партнёрами для того, чтобы положить конец эпидемии СПИДа к 2030 году. Вы можете узнать больше на сайте unaids.org или связавшись с нами через Facebook и Twitter.